

<b>ازהרות לאדם:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• התכשיר מזיק בבליעה, שאיפה ובמגע עם העור</li> <li>• התכשיר עלול לגרום לגידרי בעיניים.</li> </ul> <p><b>אמצעי בטיחות ומיגון:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אין לאכול, לשחות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.</li> <li>• יש לבוש בגין עבודה ארוכים, נעליים סגורות,</li> <li>• משקפי מגן (לפי תקן 166-EN), כפפות גומי (לפי תקן 3/374-EN)</li> <li>ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן מסוג 3 (לפי תקן 3-FFP3-EN).</li> <li>• המנע מ מגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור.</li> <li>• לאחר שימוש התכשיר יש להתרחץ ולהחליף בגדים.</li> <li>• יש לכסם את בגין העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.</li> </ul> <p><b>סיכון לסביבה:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• התכשיר רעליל לדגים, ליוצרים החיים במים ולדבורים.</li> <li>• הוראות שימוש:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.</li> <li>▪ השימושים הווטרנריים קובעים שימוש לא נכון בתכשיר אין להזין מעלי גירה בצלב מעופות שטופלו בתכשיר. יש לאבק את העופות בהתאם להנחיות המופיעות בטבלה שלහן ולודԶא כי הולל אתום וסגור כך שתימנע דליפת התכשיר לסביבה:</li> </ul> </ul>
--

סוג הטפיל	טיפל	מי	מיקום הטפיל	uninon	עופות הטלה:	הערות
						קרדיות
			על העוף (בעיקר באיזור האזורה הביבי)	כ-10 גרם (אזור האזורה)	טיפול אחד	קדנית העוף הצפונית (קדנית העוף הטרופית באיזור העוף)
			על כל עוף (בעיקר באיזור הכנפיים)	כ-15 גרם (בכיסויו)	טיפול אחד	קדנית הנוצה
			בלילה - אבקה לאבקת התלה	כ-10 גרם (בכיסויו)	תאי הטלה	יש לאבק את תאיה התלה סמור למועד הקנסת העופות על הטיפול לפאי הצורך*
			בלילה - אבקה לאבקת התלה	כ-10 גרם (בכיסויו)	תאי הטלה	קדנית העוף האדומאה
			בלילה - אבקה לאבקת התלה	-	טיפול:	יש לאבק את התלה על העופות לאחר טיפול לאחר 10 ימים
			(בחלקו הגוף השוניים)	כ-15 גרם (על העוף)	עופות רבייה:	טיפול לאחר 10 ימים

<p><b>עזרה ראשונהomidut leRofe'a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• במקרה של מגע בעיניים - שטוף היפט במים זורמים לפחות 15 דקות לפחות ופנה מיד לקליטת טיפול רפואי.</li> <li>• במקרה של מגע בעור - שטוף היפט בהרבה מים זורמים וסבון.</li> <li>• במקרה והగירוי נמשך, פנה לקליטת טיפול רפואי.</li> <li>• במקרה של בליעת לילע - אם הפגע בהכרה, השקה בלבד יותר מ- 2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להתקאה. אין להשיקות נפגע חסר הכרה.</li> <li>• במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשי נשימה, פנה לקליטת טיפול רפואי.</li> <li><b>עזרה לרופא:</b> המרכז הארצי למידע בהרעות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 0091977-04-00.</li> </ul> <p><b>עזרה לרופא:</b> אין להשתמש בתכשיר פיני לעזרה רפואיות יש להציג תווית זו לרופא.</p>
--

<p><b>עזרה ראשונהomidut leRofe'a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• במקרה של מגע בעיניים - שטוף היפט במים זורמים לפחות 15 דקות לפחות ופנה מיד לקליטת טיפול רפואי.</li> <li>• במקרה של מגע בעור - שטוף היפט בהרבה מים זורמים וסבון.</li> <li>• במקרה והגירוי נמשך, פנה לקליטת טיפול רפואי.</li> <li>• במקרה של בליעת לילע - אם הפגע בהכרה, השקה בלבד יותר מ- 2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להתקאה. אין להשיקות נפגע חסר הכרה.</li> <li>• במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשי נשימה, פנה לקליטת טיפול רפואי.</li> <li><b> במידע לרופא:</b> המרכז הארצי למידע בהרעות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 0091977-04-00.</li> </ul> <p><b>עזרה לרופא:</b> אין להשתמש בתכשיר פיני לעזרה רפואיות יש להציג תווית זו לרופא.</p>
--



مكافحة فش الطيور الحمراء يجحب رش المبني واقفاص  
بض، المشارب والمعالف بمادة اكريليتين 20% سائل بعد ا  
لقن والمبني (ومعاودة الرش بعد 10 أيام) تبعاً لتعليمات

فترة الانتظار لجمع البيض 24 ساعة بـ

**نهاية المادة المسكونية:** مستحضر مسكون يغطي بالنجا  
مع بواء مغلق وينقل لموقع النفايات السامة، وكذلك مست  
للاحيته او تلف اثناء التخزين يعتبر نفايات سامة ويجب  
الاتصال بالجهة المسؤولة

**الخزين:** يجب خزن مستحضر الاكريليتين بعبوته الأصلية  
ادا خاص للمبيدات الكيماوية، وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال

**لأشخاص الغير مؤهلين** **خلص من العبوات الفارغة:** يجب القاء العبوات الفارغة **فجأيات**

**عافات أولية:** بحال ملامسته للجلد اغسل المكان المصاب  
صابون وبحال ملامسته للاعين اغسل جيداً بكمية كبيرة  
ماء، وبحالة الشك بالتشمّس يجب التوجّه فوراً للطبيب مع من

**الطبیب**: المركز القطري للتسمم مستشفى رمبام  
هاتف مركز السموم جامعة النجاح نابلس 000-500-500-500

اقررت وزارة الخدمات البيطرية ان استعمال غير سليم  
للتلعيمات المرفقة قد يضر بالمستعمل والحيوانات وقد يسبب  
على صحة الجمهور والبيئة ويشكل خرقا للقانون

A horizontal red graphic element consisting of three curved bands of varying lengths, positioned at the bottom of the slide.

نوع الطفيل	الطفيل الحشرة	مكان العلاج	المقادير	ملاحظات
الفش	فش الطيور الشمالي فش الطيور الاستوائي	على الطائر (منطقة الجمع)	الدواجن البياضة 10 غرام للطائر	يجب التأكيد بأن الفص مغناطيسي جيدا بطريقة تمنع تسرب المستحضر للبيئة المحيطة
فش الريش	فقط على الطائر (خاصة بمنطقة الاجنحة)	طيور التكثير 15 غرام للطائر	علاج واحد للطائر	
الفش الاحمر	المعاملة نهارا باقفاصل التبييض كل قفص 10 غرام	بااقفاصل التبييض على الطيور	بااقفاصل التبييض المعاملة ليلا:	يجب تعفير اقفاص التبييض فربما من موعد ادخال الطيور للقن و إعادة المعالجة حسب الضرورة
القمل	على الطائر وعلى كل اجزاء الجسم المختلفة	طيور بياضة 10 غرام للطائر طيور التكثير 10 غرام للطائر	بعد 10 أيام	يجب معاودة العلاج

# اكريتین مسحوق 1%

## مستحضر لمكافحة الفش والقمل على الطيور

### اقرأ بتمعن تعليمات الاستعمال المرفقة قبل الاستعمال

**حذير:** المستحضر يسبب لتهيج بالاعين والمسالك التنفسية والجلد  
**سائل الحذر والوقاية**  
بين التعامل مع المستحضر (تحضير الرش وتطبيقه) يجب استعمال وسائل وقائيه  
اللامنةة مثل:

الملابس عمل طويلة حذاء طويل ومغلق. فقايرات (EN166) نظارات واقية (3) (EN374) (3) (EN140) (EN14387 APEK-1P3) مع فلتر متصل من نوع (EN140).

عند الانتهاء من التطبيق يجب غسل الایدي جيداً بالماء والصابون وغسل ملابس  
عمل بصورة منفردة من الملابس الأخرى  
امتنع من ملامسة المستحضر للاعين والجلد

**خاطر للبيئة:** المستحضر سام للأسماك والكائنات المائية والنحل تعليمات الاستعمال يجب تغيير الدوافع تبعاً للتعليمات الواردة في جدول الاستعمال