



ירסל ד Virsal T מרכיב חי סלמוני טיפימורום - זן MTR40

- הacen כמות מים הנצרכת ע"י הלקה תוך 1-2 שבועות.
- הוסף "ניוטרחלור כחול" מוצרכת ביואק לניטרול הצלור במיל השתייה, על פי ההוראות המצוירות לתקשיר.
- המס את התרכיב המבוסס במים מעוקרים או רתנים ומוקורים ללא שרירות חומרים אנטיביידקים וחומר חיטוי. השתמש בתרכיב מיד לאחר המסתנו.(לא יאוחר משעה לאחר המסתנו)
- הוסף את התרכיב המבוסס למיל השתייה, 15 דקות לאחר הוספת "ניוטרחלור כחול". ערבות היטב חדש את אספקת הפיסים רק עם גמר צrichtת כל כמות הפיסים המכילה את התרכיב.

אמצעי בטיחות ומיגון
 בזמן הנקה התרכיב ויישומו לבש כפפות חד-פעמיות, מסכת פנים חד פעמיות ומשקפי מגן.
 עם סיום השיקוש, השמד שרירות תרכיב ורחץ ידיים היטב בסבון.
 במקורה של מגע התרכיב עם העור שטוף היטב במים וובן.
 במקורה של בליעת התרכיב, יש לפנות לעזרה רפואית בלויין בקבוק התרכיב והעלון המצורף (ז) התרכיב ריש למספר תכשירים אנטיביידקיים כולל קוונילונים).

זמן המתנה

- בשר: 21 ימים.
- ביצים: 21 ימים.

אחסון

- בקורר 2-8 מ"צ.
- מוגן מקרינת שם ישירה.
- אין להקליפה את התרכיב.

תכנית חיסונית מומלצת

רבייה	תרנגולות	ביצי מאכל	טיטילות	דרך מתן	גיל
+	+	+	ריטסום/מי שתייה	ו ימים	
+		+	מי שתייה	5-7 שבועות	
-		+	מי שתייה	12-13 שבועות	
+		-	מי שתייה	16-20 שבועות	

אריזה

הרכיב משוק באזיות של 10 בקבוקי זכוכית המוכלים: 1000, 2000, 2500, 5000 מיל.

עלון נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרנריים בתאריך 01/05/2018 מס' רישום התרכיב בנקס התרכיבים הווטרנריים הינו: 1-195-03-05

שם בעל הרשות: ביואק בע"מ
 רח' האילן 30, אזור עקיבה, ישראל 30600000
 טל. 04-6266775. פקס: 04-6266772
 vireo@biovac.co.il

תאור
 תרכיב חי סלמוני טיפימורום, זן MTR40, מיובש בהקפאה.

תכולה
 כל מנת תרכיב מכילה, $10^8 \text{ CFU} \times 5 \text{ ml}$.
 כדייך סלמוני טיפימורום חי מוחלש, זן MTR40.

התווויות הנגד ואזהרות
 הקנית חיסון פועל בתרגולות להפחמת נשאות והפרשה של סלמוני טיפימורום.

התווויות הנגד ואזהרות
 • התרכיב מיועד לחיסון להקטה בריאות בלבד.
 • אין לחסן 21 יום לפני תחילת תקופת הטלה.
 • אין להגיש תכשירים אנטיביידקיים 3 ימים לפחות החיסון ואחריו.
 • כלל, אין לערבב את התרכיב יחד עם תרכיבים אחרים, פרט לירסל-E.
 • שימוש התרכיב אינו משפיע על תגובה חיסונית לנוקס. השפעה על תגובה חיסונית אחרות לא נבדקה.
 • אין לצרוך ביצי מאכל בתקופה הקרצה מ-21 يوم לאחר החיסון.
 • חיסון תרגולות בתרכיב, אינו מעורר תגובה חיסונית מוגברת ביחס לבדיקה נוכחית של סלמוני גלינורום/פולורום.

הוראות שימוש
 • השימוש בתרכיב על פי הוראת רופא וטרינר מטפל.
 • הקפד על מינון של מנה לתרנגול.
 • לשימוש וטרינרי בלבד.

רישום
 • מועוד השימוש ברישום מותווה לגיל יום בלבד.
 • וודא שהמרוסס נקי ולא שרירות של חומרן חיטין.
 • המס את התרכיב - 10 מ"ל מים מעוקרים או רתנים מוקורים היטב.
 • דלול כל 1000 מנת תרכיב - 150-200 מ"ל מים מוקורים למיהול תרפוות ותריכבים "מדיא-אקס" מוצרכת "ביואק".
 • הפחת את עצמת התאורה בלבד.
 • 800-30-60 ס"מ מעל ראשי העופות במרסס מתחאים וכוכoon.
 • יש לסיסם את השימוש עד שעתים לאחר המסת התרכיב.

מי שתייה
 •odge שמרכזת הפיסים נקה משאריות חומר חיטין, מחמיצים וחומרים אחרים בעלי פעילות אנטיביידקיות 3 ימים טרם מותן התרכיב.
 • אפרוחים בגיל יום יש לחסן במתן התרכיב ב"מים הראשוניים".
 • הגדמת התיפות 1-2 שעות לפני מותן התרכיב (בהתאם לתנאי מזג האוויר).