

אזהרות לאדם:

- התכשיר מסוכן בבליעה, במגע עם העור ובשאיפה.
- התכשיר עלול לגרום לגירוי חריף בעיניים ולגירוי בעור.
- **אמצעי בטיחות ומיגון:**
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן יישום התכשיר.
- בזמן העבודה עם התכשיר (הכנת התרסיס ויישומו) לבש ביגוד מגן מלא הכולל נעלי עבודה, כפפות נאופרן (לפי תקן EN-374/3) וסרבל עמיד לכימיקלים.
- יש להשתמש במסכת פנים מלאה להגנה על דרכי הנשימה (לפי תקן EN-136)
- עם מסנן (לפי תקן EN-14387) מסוג ABEK2-P3.
- הנמנע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור.
- לאחר יישום התכשיר התרחץ והחלף בגדים.
- יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
- התכשיר דליק, אין לרסס ישירות בקרבת אש גלויה וציוד חשמלי.

סיכונים לסביבה:

- התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
- התכשיר רעיל לדבורים.
- התכשיר רעיל לחתולים.
- אין לזהם מאגרי ומקורות מים. מנע הגעת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים וביוב.

הוראות שימוש:

**זמן המתנה לשיווק ביצים:** 24 שעות לאחר יישום התכשיר.  
יש לדלל אקריתין 20 במים בהתאם להוראות בטבלה שלהלן:

| קרדיות                    | מיקום הטפיל                         | מיהול                                              | נפח התרסיס                                                                                                            | הערות                            |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| העוף הצפופית העוף הטרופית | בעיקר על העוף (אזור הביב)           | %0.05 ח"פ (1:400) 1 ליטר אקריתין 20 ב-400 ליטר מים | <b>עופות הטלה:</b> 100 סמ"ק תכשיר מהול לעוף                                                                           | יש לחזור על הטיפול כעבור 10 ימים |
| הנוצה                     | רק על העוף, בעיקר באזור הכנפיים     | %0.05 ח"פ (1:400) 1 ליטר אקריתין 20 ב-400 ליטר מים | <b>עופות רביה:</b> 200-250 סמ"ק תכשיר מהול לעוף                                                                       |                                  |
| אדומה                     | ביום - בתאי ההטלה - בלילה - על העוף | %0.10 ח"פ (1:200) 1 ליטר אקריתין 20 ב-200 ליטר מים | לאחר פינוי העופות יש לרסס היטב את המבנה, בנפח תרסיס של 1 ליטר ל-15-20 מ"ר, הריסוס יתבצע על ארגזי הטלה, שקתות ומאביסים | -                                |

אחסון:

- יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מאוורר, מוצל, נעול, קריר, הרחק ממקור חום ואש, במקום המיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר
- יש לאחסן התכשיר הרחק ממזון בני אדם ובעלי חיים.
- **אקריתין 20** - נשאר פעיל ויציב במשך שנתיים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן במקום יבש בטמפרטורה מתחת ל- 30°C.

טיפול בארזות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס, נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של **שאיפה** - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה, פנה לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של **בליעה** - אם הנפגע בהכרה, השקה בלא יותר מ-2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להקאה.
- במקרה של מגע ב**עור** - שטוף היטב בהרבה מים זורמים וסבון. במידה והגרוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של מגע ב**עיניים** - שטוף היטב במים זורמים למשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

**מידע לרופא:** המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 04-7771900.

במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

- אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
- השירותים הוטרינרים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על-פי הוראות התווית, עלול לפגוע במשתמש, בבעלי חיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

**הודעה חשובה:** כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם. עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע גורמים רבים שאינם בשליטתנו, כגון מזג אויר, סוג הקרקע, תנאי הגידול, אופן האחסנה ואופן השימוש במוצר. לפיכך לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק, ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.



תعليمات الاستعمال

يجب خلط اكريتين 20 بالماء حسب ما ورد بجدول الاستعمال التالي:

| القمّل                                       | مكان العناية                                   | المقادير                                              | حجم الرش                                                                                                 | ملاحظات                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| قمل الطيور الشمالية<br>قمل الطيور الاستوائية | بالأساس على الدجاج (منطقة الحضيض)              | %0.05 م.ف (1:400) 1 لتر اكريتين20 لكل 400 لتر ماء     | الدجاج البياض: 100 سم3 مستحضر محلول لكل طير                                                              | يجب إعادة المعاملة بعد مرور 10 ايام |
| قمل الريش                                    | فقط على الطير بمنطقة الجناحين                  | %0.05 م.ف (1:400) 1 لتر اكريتين20 لكل 400 لتر ماء     | الدجاج التكاثر: 200-250 سم3 مستحضر محلول لكل طير                                                         |                                     |
| القملة الحمراء                               | بالنهار – بداخل اقفاص البيض بالليل – على الطير | %0.10 م.ف (1:200) 1 لتر اكريتين20 محلول ب 200 لتر ماء | بعد اخلاء الطيور يجب رش المبني جيدا بحجم رش 1 لتر محلول لكل 15-20 م2 ,الرش يتم على صناديق البيض والاحواض |                                     |

فترة الانتظار لتسويق البيض: 24 ساعة بعد المعاملة

